

FOLIO®

GOLD

قوة علاجية ، وحماية أكيدة ومديدة

فوليو جولد ... راحة بال

syngenta®


يحتوي فوليو جولد على مادتين تكمل احدهما الأخرى لتؤمنان حماية مزدوجة في داخل النبات وخارجه :

- 1 - مادة مفينوكسام : المادة الجهازية التي تثبط نمو الميسليوم وبالتالي تؤمن الحماية داخل أنسجة النبات من أمراض البياض الزغبي واللفحة المتأخرة وأمراض أخرى مشابهة.
- 2 . مادة كلوروثالونيل : المادة الوقائية الواسعة الطيف تنتشر على سطح الورقة مشكلة طبقة واقية عليها تمنع انتشار الأبواغ الفطرية.

الخصائص

إن مبيد فوليو جولد يمتلك خصائص مميزة

حماية مزدوجة



رش المادة





اللقاح والتقييم

الجهازية الإختراقية

فوليو جولد يخترق نسيج الورقة المرشوش بإتجاه السطح غير المعامل مما يضمن حماية وجهي الورقة.


الانتقال عبر ورقة النبات



نشاط جهازي

حماية كاملة لكل أجزاء النبات ومن ضمنها البراعم حديثة النمو وأجزاء النبات التي لم يصلها الرش حتى عند الإصابة العالية

الانتقال من ورقة الى ورقة





الفوائد

المميزات



البييض الزغبى / خيار



البييض الزغبى / خس



البييض الزغبى / خيار



اللفحة المتأخرة / البطاطا

•فعالية ممتازة ضد أمراض البياض الزغبى و اللفحة المتأخرة
•الاستخدام في مجال واسع من المحاصيل الزراعية.

خلطة جاهزة مكونة من مادتين :
مفينوكسام ٣٧,٥ غ
الكلوروثالونيل ٥٠٠ غ

•تأثير فعال لمنع مقاومة الفطر.

تركيبه مثاليه لمادتان فعالتان لها طريقتان مختلفتان في التأثير على الفطر الممرض

•قوه مضاعفه
•مرونة في الرش
•فعالية عالية على مختلف أطوار الفطر (فعال في أي وقت جرى استعماله)فعالية علاجية مثلى

مادتان فعالتان لهما تأثير وقائي علاجي (تهاجم الفطر في ٣ مراحل مختلفة من دورة حياته)

•يوفر الحماية للبراعم الجديدة
•يوفر الحماية للأجزاء غير المعالجة من النبات/الأوراق
•يوفر حماية ممتازة حتى مع استعمال معدات الرش غير العادية
•ثابت على النبات، يؤمن له عدم الإنفسال عن طريق الأمطار أو الري الرذاذي

امتصاص سريع في الأوراق
جهازي وإخترافي

•حماية طويلة من الأمراض الفطرية
•توفير في عدد الرشوات

تركيبه مثاليه لمادتان فعالتان لها تأثير طويل على المرض

سريع العمل والتأثير يعمل بمجرد ملامسة المادة للسطح
•توفير الحماية الكاملة للنبات من الداخل والخارج

•مبيد فطريات واحد للكثير من المحاصيل
•يستعمل على مدار السنة
•مناسب لبرامج مكافحة متكاملة

يستعمل في مجال واسع من المحاصيل

•قابلية تصدير المنتج المعامل الى مختلف دول العالم

مسجل على مستوى العالم

•آمن بالنسبة للمستخدم النهائي والمستهلك والبيئة

آمن وصديق للبيئة

فعالية فوليو جولد على مراحل المرض



وقائي :

قبل حدوث المرض.
يمنع تشكل الإصابة

علاجي :

عند حدوث الإصابة
يمنع تطور وتشكل الإصابة
والتي لا تظهر للعين المجردة

إستئصال :

عند ظهور أعراض المرض
يوقف الإصابة مباشرة
ويمنع إنتشارها

ضد التبوغ :

مرحلة تكون الأبواغ وانتقالها الى
أوراق أخرى (مرحلة متقدمة)
يقتل الأبواغ ويمنع تكرار الإصابة

تعليمات الإستعمال

ملاحظات	آخر موعد للرش قبل القطف	نسبة الإستعمال (سم ³) للدونم أول ١٠٠ لتر ماء)	الآفة	المحصول
يرش في الموسم ٣ رشات	٣ أيام	٢٥٠ - ٢٠٠	البياض الزغبي	القرعيات خيار (بيوت بلاستيكية وحقل مكشوف)، كوسا، بطيخ، شمام
يرش خلال الموسم ٣ مرات. الرشة الأولى عند مرحلة الازهار ورشة ثانية بعد ١٤ يوم وإذا كان الحقل المزرع مصاب سابقاً بأعضان الدرنات استخدم رشة ثالثة بعد ١٤ يوم من الرشة الثانية	٧ أيام	٢٥٠ - ٢٠٠	اللفحة المتأخرة أعضان الدرنات والأعضان النتيجة عن التخزين	البطاطا
يرش في الموسم ٣ رشات	٣ أيام	٢٥٠ - ٢٠٠	اللفحة المتأخرة وتعفن الثمار النتائج عن أنواع الفايثوفورا	البندورة
يرش في الموسم ٣ رشات	١٤ يوم	٢٥٠ - ٢٠٠ + مادة لاصقة	البياض الزغبي	البصل
يرش في الموسم ٣ رشات	١٤ يوم	٢٠٠	البياض الزغبي والصدأ الأبيض	الملفوف والزهرة
يرش في الموسم رشتان	١٤ يوم	٢٥٠	البياض الزغبي	الفاصولياء والذول
يرش في الموسم رشتان	٢١ يوم	٢٥٠ - ٢٠٠	البياض الزغبي	البازيلاء

ملاحظة : إبدأ بالرش عندما تكون الظروف الجوية مناسبة لاحداث المرض وقبل حدوث الإصابة، أو عند أول ظهور للمرض.

الرجاء قراءة الملصق على العبوة بعناية لمعرفة ارشادات الإستعمال.
لمزيد من التفاصيل الرجاء الإتصال بالوكيل المعتمد.